



Régurgitation tricuspide

La régurgitation tricuspide (souvent appelée fuite de la valve tricuspide) est une forme de valvulopathie. Elle survient quand la valve ne se ferme pas complètement. Lorsque la valve fuit, le cœur ne peut pas pomper le sang correctement.

Signes et symptômes

Les symptômes peuvent s'aggraver lorsque la valve commence à fuir davantage.



Fatigue



Essoufflement



Faiblesse



Battements
cardiaques rapides
et irréguliers



Gonflement des
chevilles ou de
l'abdomen



Pulsations dans les
vaisseaux sanguins
du cou

Options de traitement

Cela dépendra de la cause, du degré de fuite de la valve, de vos symptômes et de vos préférences.

Traitement médicamenteux

Votre médecin peut vous prescrire des médicaments, tels que des diurétiques, qui aident à éliminer l'excès de liquide dans l'organisme.

Procédures mini-invasives pour réparer la valve

La réparation ou le remplacement de la valve implique une procédure au cours de laquelle la valve est acheminée jusqu'au cœur via un fin tube appelé cathéter, inséré dans une veine de la jambe ou de l'aîne.

Réparation chirurgicale

Dans certains cas, une intervention chirurgicale à cœur ouvert peut s'avérer nécessaire.

Faites des bilans de santé réguliers

Votre équipe soignante peut surveiller votre valve en réalisant des examens d'imagerie du cœur, appelés **échocardiogrammes** ou «échos».



Avez-vous besoin d'une nouvelle valve cardiaque ?

Si vos symptômes sont graves, une intervention sur la valve peut être nécessaire.

Vous pouvez discuter avec votre professionnel de santé de l'option qui vous conviendrait le mieux.

- Procédure moins invasive
- Réparation chirurgicale

